

## 第4节 判断函数零点所在区间 (★★)

### 强化训练

1. (2022·河南焦作一模·★) 设函数  $f(x) = 2^x + \frac{x}{3}$  的零点为  $x_0$ , 则  $x_0 \in$  ( )

- (A)  $(-4, -2)$  (B)  $(-2, -1)$  (C)  $(1, 2)$  (D)  $(2, 4)$

答案: B

解析: 先判断单调性, 因为  $y = 2^x$  和  $y = \frac{x}{3}$  都在  $\mathbf{R}$  上  $\nearrow$ , 所以  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上  $\nearrow$ ,

从而要判断零点所在区间, 只需看哪个区间端点函数值异号, 下面逐个验证选项,

因为  $f(-4) = 2^{-4} + \frac{-4}{3} < 0$ ,  $f(-2) = 2^{-2} - \frac{2}{3} < 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(-4, -2)$  上无零点;

又  $f(-1) = 2^{-1} - \frac{1}{3} > 0$ , 所以  $f(-2)f(-1) < 0$ , 故  $x_0 \in (-2, -1)$ .

2. (2022·湖南临湘期末·★) 函数  $f(x) = x + \cos x$  的零点所在的区间为 ( )

- (A)  $(-1, -\frac{1}{2})$  (B)  $(-\frac{1}{2}, 0)$  (C)  $(0, \frac{1}{2})$  (D)  $(\frac{1}{2}, 1)$

答案: A

解析: 先判断单调性, 这里需要求导来判断, 由题意,  $f'(x) = 1 - \sin x \geq 0$ , 所以  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上  $\nearrow$ ,

从而  $f(x)$  最多一个零点, 要判断零点所在区间, 只需看哪个区间端点函数值异号, 下面逐个验证选项,

由题意,  $f(-1) = -1 + \cos(-1) < 0$ ,  $f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + \cos(-\frac{1}{2}) = -\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{1}{2} = \cos\frac{1}{2} - \cos\frac{\pi}{3}$ ,

要判断上式的正负, 可结合  $y = \cos x$  在  $(0, \pi)$  上的单调性来比较  $\cos\frac{1}{2}$  和  $\cos\frac{\pi}{3}$  的大小,

注意到  $y = \cos x$  在  $(0, \pi)$  上  $\searrow$ , 且  $0 < \frac{1}{2} < \frac{\pi}{3} < \pi$ , 所以  $\cos\frac{1}{2} > \cos\frac{\pi}{3}$ , 从而  $f(-\frac{1}{2}) > 0$ ,

故  $f(x)$  的零点所在的区间是  $(-1, -\frac{1}{2})$ .

【反思】像这种单选题, 也可不判断单调性, 直接看端点值, 解析为了严谨, 仍然判断了单调性.


3. (★) 若函数  $f(x) = 2^x + 3x + a$  在  $(0, 1)$  内存在零点, 则实数  $a$  的取值范围是 ( )

- (A)  $(-\infty, -5)$  (B)  $(-5, -1)$  (C)  $(0, 5)$  (D)  $(1, +\infty)$

答案: B

解析: 先判断单调性, 因为  $y = 2^x$  和  $y = 3x + a$  都在  $\mathbf{R}$  上  $\nearrow$ , 所以  $f(x) = 2^x + 3x + a$  在  $\mathbf{R}$  上  $\nearrow$ ,

如图,  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上存在零点等价于  $\begin{cases} f(0) < 0 \\ f(1) > 0 \end{cases}$ , 即  $\begin{cases} 1 + a < 0 \\ 5 + a > 0 \end{cases}$ , 解得:  $-5 < a < -1$ .



4. (2022·辽宁沈阳模拟·★★) 设函数  $f(x) = \frac{1}{3}x - \ln x$ , 则  $f(x)$  ( )

- (A) 在区间  $(\frac{1}{e}, 1)$ ,  $(1, e)$  内均有零点  
 (B) 在区间  $(\frac{1}{e}, 1)$ ,  $(1, e)$  内均没有零点  
 (C) 在区间  $(\frac{1}{e}, 1)$  内有零点, 在  $(1, e)$  内没有零点  
 (D) 在区间  $(\frac{1}{e}, 1)$  内没有零点, 在  $(1, e)$  内有零点

答案: D

解析: 先判断单调性, 这里需要求导来判断, 由题意,  $f'(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{x} = \frac{x-3}{3x}$ ,

所以  $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 3$ ,  $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 3$ , 从而  $f(x)$  在  $(0, 3)$  上  $\searrow$ , 在  $(3, +\infty)$  上  $\nearrow$ ,

又  $f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{3e} + 1 > 0$ ,  $f(1) = \frac{1}{3} > 0$ ,  $f(e) = \frac{e}{3} - 1 < 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(\frac{1}{e}, 1)$  上没有零点, 在  $(1, e)$  上有零点.

5. (★★) 已知函数  $f(x) = e^{-x} - 2x - 5$  的零点位于区间  $(m, m+1)$ ,  $m \in \mathbf{Z}$ , 则  $2^m + \log_4 |m| =$  ( )

- (A)  $-\frac{1}{4}$  (B)  $\frac{1}{4}$  (C)  $\frac{1}{2}$  (D)  $\frac{3}{4}$

答案: D

解析: 先判断单调性,  $y = e^{-x}$  和  $y = -2x - 5$  都在  $\mathbf{R}$  上  $\searrow \Rightarrow f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上  $\searrow$ , 所以  $f(x)$  最多一个零点,

欲求  $2^m + \log_4 |m|$ , 得先求  $m$ , 我们需要把  $f(x)$  的零点估计在两个相邻的整数之间,

通过计算可得  $f(-2) = e^2 - 1 > 0$ ,  $f(-1) = e - 3 < 0$ , 所以  $f(x)$  的零点  $x_0 \in (-2, -1)$ ,

由题意,  $x_0 \in (m, m+1)$  且  $m \in \mathbf{Z}$ , 所以  $m = -2$ , 故  $2^m + \log_4 |m| = 2^{-2} + \log_4 |-2| = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ .

6. (2022·河南洛阳期末·★★★★) 已知函数  $f(x) = x + x^3$ ,  $g(x) = x + 3^x$ ,  $h(x) = x + \log_3 x$  的零点分别为  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , 则 ( )

- (A)  $x_2 > x_3 > x_1$  (B)  $x_3 > x_2 > x_1$  (C)  $x_1 > x_2 > x_3$  (D)  $x_3 > x_1 > x_2$

答案: D

解析: 要比较三个函数的零点, 可先看看零点是否可求, 观察发现  $f(x)$  的零点可求,

$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 + x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ , 所以  $x_1 = 0$ ;

函数  $g(x)$  和  $h(x)$  的零点均不可求, 故考虑用零点存在定理估算其范围,

因为  $y = x$  和  $y = 3^x$  均在  $\mathbf{R}$  上  $\nearrow$ , 所以  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上  $\nearrow$ , 又  $g(-1) = -1 + 3^{-1} = -\frac{2}{3} < 0$ ,  $g(0) = 3^0 = 1 > 0$ , 所以  $g(x)$  的零点  $x_2 \in (-1, 0)$ ; 因为  $y = x$  和  $y = \log_3 x$  均  $\nearrow$ , 所以  $h(x)$  在  $(0, +\infty)$  上  $\nearrow$ , 又  $h(\frac{1}{3}) = \frac{1}{3} + \log_3 \frac{1}{3} = -\frac{2}{3} < 0$ ,  $h(1) = 1 > 0$ , 所以  $h(x)$  的零点  $x_3 \in (\frac{1}{3}, 1)$ , 故  $x_3 > x_1 > x_2$ .