

## 第七章 复数 (★★)

### 内容提要

复数绝大部分考题难度都不高，主要考查复数的基本概念和四则运算，下面先梳理相关的基础知识。

1. 复数的概念：形如  $a+bi(a, b \in \mathbf{R})$  的数叫做复数，其中  $i$  叫做虚数单位， $i^2 = -1$ ； $a$  叫做实部， $b$  叫做虚部（注意，不是  $bi$  为虚部）。

2. 对于复数  $z = a+bi(a, b \in \mathbf{R})$ ， $z$  为实数  $\Leftrightarrow b = 0$ ； $z$  为虚数  $\Leftrightarrow b \neq 0$ ； $z$  为纯虚数  $\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b \neq 0 \end{cases}$ 。

3. 复数相等：设  $z_1 = a+bi$ ， $z_2 = c+di$ ，其中  $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ ，则  $z_1 = z_2 \Leftrightarrow a = c$  且  $b = d$ 。

4. 复数的几何意义：复数  $z = a+bi$  与复平面内的点  $Z(a, b)$  一一对应，与复平面内的向量  $\overrightarrow{OZ}$  一一对应。

5. 复数的模：设复数  $z = a+bi$ ，则我们把  $\overrightarrow{OZ}$  的模叫做  $z$  的模，记作  $|z|$ ， $|z| = |a+bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

6. 共轭复数：复数  $z = a+bi$  的共轭复数为  $a-bi$ ，记作  $\bar{z} = a-bi$ ； $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ 。

7. 复数的四则运算：设复数  $z_1 = a+bi$ ， $z_2 = c+di$ ，其中  $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ ，则

①  $z_1 + z_2 = a+bi + c+di = (a+c) + (b+d)i$ ；②  $z_1 - z_2 = a+bi - c-di = (a-c) + (b-d)i$ ；

③  $z_1 z_2 = (a+bi)(c+di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$ ；

④  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac - adi + bci - bdi^2}{c^2 - d^2i^2} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$ 。

8. 小结论：

① 设  $z_1, z_2$  为两个复数，则  $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ ， $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ；（设复数的代数形式，代入此两式即可证明）

② 设  $k \in \mathbf{N}$ ，则  $i^{4k} = 1$ ， $i^{4k+1} = i$ ， $i^{4k+2} = -1$ ， $i^{4k+3} = -i$ ；

③ 请注意， $|z|^2 \neq z^2$ 。（设  $z = a+bi(a, b \in \mathbf{R})$ ，则  $|z|^2 = a^2 + b^2$ ， $z^2 = a^2 - b^2 + 2abi$ ，显然不等）

### 典型例题

#### 类型 I：复数的四则运算

【例 1】（2022·天津卷）已知  $i$  是虚数单位，化简  $\frac{11-3i}{1+2i}$  的结果为\_\_\_\_\_。

解析：计算复数的除法，可分子分母同乘以分母的共轭复数，将分母实数化，

$$\frac{11-3i}{1+2i} = \frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{11-22i-3i+6i^2}{1-4i^2} = \frac{5-25i}{5} = 1-5i.$$

答案：1-5i

【变式】设  $i$  为虚数单位，已知复数  $z = \frac{5}{a+i}$  满足  $|z| = \sqrt{5}$ ，其中  $a \in \mathbf{R}$  且  $a > 0$ ，则  $z =$ \_\_\_\_\_。

解法 1：可先计算  $z$ ，再求模，由题意， $z = \frac{5}{a+i} = \frac{5(a-i)}{(a+i)(a-i)} = \frac{5a-5i}{a^2-i^2} = \frac{5a-5i}{a^2+1} = \frac{5a}{a^2+1} - \frac{5}{a^2+1}i$  ①，

所以  $|z| = \sqrt{\left(\frac{5a}{a^2+1}\right)^2 + \left(-\frac{5}{a^2+1}\right)^2} = \sqrt{\frac{25a^2+25}{(a^2+1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{a^2+1}}$ , 由题意,  $|z| = \sqrt{5}$ , 所以  $\frac{5}{\sqrt{a^2+1}} = \sqrt{5}$ ,

结合  $a > 0$  可得  $a = 2$ , 代入①得:  $z = 2 - i$ .

解法 2: 也可先由模的性质  $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  求  $|z|$ ,  $z = \frac{5}{a+i} \Rightarrow |z| = \frac{|5|}{|a+i|} = \frac{5}{\sqrt{a^2+1}}$ ,

由题意,  $|z| = \sqrt{5}$ , 所以  $\frac{5}{\sqrt{a^2+1}} = \sqrt{5}$ , 结合  $a > 0$  可得  $a = 2$ ,

故  $z = \frac{5}{a+i} = \frac{5}{2+i} = \frac{5(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{5(2-i)}{4-i^2} = \frac{5(2-i)}{5} = 2-i$ .

答案:  $2-i$

【例 2】(2021·全国甲卷) 已知  $(1-i)^2 z = 3+2i$ , 则  $z =$  ( )

(A)  $-1-\frac{3}{2}i$  (B)  $-1+\frac{3}{2}i$  (C)  $-\frac{3}{2}+i$  (D)  $-\frac{3}{2}-i$

解析: 复数  $z$  由方程的形式给出, 先由该方程分离出  $z$ , 再进行计算,

因为  $(1-i)^2 z = 3+2i$ , 所以  $z = \frac{3+2i}{(1-i)^2} = \frac{3+2i}{1-2i+i^2} = \frac{3+2i}{-2i} = \frac{(3+2i)2i}{(-2i) \cdot 2i} = \frac{6i+4i^2}{-4i^2} = \frac{6i-4}{4} = -1+\frac{3}{2}i$ .

答案: B

【反思】当复数  $z$  以方程的形式给出时, 可先分离出  $z$ , 再对另一侧进行化简.

## 类型 II: 复数代数形式的运用

【例 3】(2022·全国乙卷) 已知  $z = 1-2i$ , 且  $z + a\bar{z} + b = 0$ , 其中  $a, b$  为实数, 则 ( )

(A)  $a=1, b=-2$  (B)  $a=-1, b=2$  (C)  $a=1, b=2$  (D)  $a=-1, b=-2$

解析:  $z = 1-2i \Rightarrow \bar{z} = 1+2i$ , 代入  $z + a\bar{z} + b = 0$  得:  $1-2i + a(1+2i) + b = 0$ , 所以  $1+a+b + (2a-2)i = 0$ ,

两个复数相等, 则实部和虚部对应相等, 右侧的 0 可看成  $0+0 \cdot i$ , 故  $\begin{cases} 1+a+b=0 \\ 2a-2=0 \end{cases}$ , 解得:  $\begin{cases} a=1 \\ b=-2 \end{cases}$ .

答案: A

【变式】已知  $i$  为虚数单位, 复数  $z$  满足  $|z-2i| = |z|$ , 则  $z$  的虚部为\_\_\_\_\_.

解析: 所给方程有模, 无法分离出  $z$ , 故设  $z$  的代数形式, 代入  $|z-2i| = |z|$  求解,

设  $z = a+bi (a, b \in \mathbf{R})$ , 则  $z-2i = a+(b-2)i$ , 由题意,  $|z-2i| = |z|$ ,

所以  $\sqrt{a^2+(b-2)^2} = \sqrt{a^2+b^2}$ , 解得:  $b=1$ , 故复数  $z$  的虚部为 1.

答案: 1

【总结】当不便于通过简单的变形分离出复数  $z$  再计算时, 可考虑设  $z = a+bi$ , 翻译已知条件, 建立方程组求出  $a$  和  $b$ .

### 类型III：复数的运算性质

【例4】已知 $\bar{z}$ 是复数 $z$ 的共轭复数，则下列式子中与 $z \cdot \bar{z}$ 不相等的是（ ）

- (A)  $|\bar{z}^2|$     (B)  $|z|^2$     (C)  $|z^2|$     (D)  $\bar{z}^2$

解法1：诸多选项涉及复数的模，可用模的运算性质 $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ 来快速判断选项，

设 $z = a + bi$ ，则 $\bar{z} = a - bi$ ，所以 $|z| = |\bar{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，且 $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$  ①，

A项， $|\bar{z}^2| = |\bar{z} \cdot \bar{z}| = |\bar{z}| \cdot |\bar{z}| = |\bar{z}|^2 = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

B项，因为 $|z|^2 = a^2 + b^2$ ，结合①知 $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ ；

C项， $|z^2| = |z \cdot z| = |z| \cdot |z| = |z|^2 = a^2 + b^2$ ，结合①知 $|z^2| = z \cdot \bar{z}$ ；

D项， $\bar{z}^2 = (a - bi)^2 = a^2 + b^2 i^2 - 2abi = a^2 - b^2 - 2abi \neq z \cdot \bar{z}$ ，故选D.

解法2：若不熟悉模的性质，也可设复数的代数形式，逐个验证选项，

设 $z = a + bi$ ，则 $\bar{z} = a - bi$ ，所以 $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$ ，

A项， $|\bar{z}^2| = |(a - bi)^2| = |a^2 + b^2 i^2 - 2abi| = |a^2 - b^2 - 2abi| = \sqrt{(a^2 - b^2)^2 + (-2ab)^2}$   
 $= \sqrt{a^4 + 2a^2 b^2 + b^4} = \sqrt{(a^2 + b^2)^2} = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

B项， $|z|^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

C项， $|z^2| = |(a + bi)^2| = |a^2 + b^2 i^2 + 2abi| = |a^2 - b^2 + 2abi| = \sqrt{(a^2 - b^2)^2 + 4a^2 b^2} = \sqrt{(a^2 + b^2)^2} = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

D项，判断方法同解法1.

答案：D

【反思】 $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = |\bar{z}|^2$ 是共轭复数的重要性质；若遇到拿不准的性质，可设复数的代数形式来检验.

【变式】(2022·全国甲卷)若 $z = -1 + \sqrt{3}i$ ， $\frac{z}{z\bar{z} - 1} =$ （ ）

- (A)  $-1 + \sqrt{3}i$     (B)  $-1 - \sqrt{3}i$     (C)  $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$     (D)  $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

解析： $z = -1 + \sqrt{3}i \Rightarrow z\bar{z} = |z|^2 = (\sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2})^2 = 4$ ，所以 $\frac{z}{z\bar{z} - 1} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{4 - 1} = -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ .

答案：C

【例5】(多选)设 $z_1, z_2, z_3$ 为复数， $z_1 \neq 0$ ，下列命题中正确的是（ ）

(A) 若 $|z_2| = |z_3|$ ，则 $z_2 = \pm z_3$

(B) 若 $z_1 z_2 = z_1 z_3$ ，则 $z_2 = z_3$

(C) 若 $\bar{z}_2 = z_3$ ，则 $|z_1 z_2| = |z_1 z_3|$

(D) 若 $z_1 z_2 = |z_1|^2$ ，则 $z_1 = z_2$

解法 1: A 项,  $|z_2|=|z_3|$  可看成复平面内  $|\overline{OZ_2}|=|\overline{OZ_3}|$ , 但方向未定, 故  $z_2=\pm z_3$  不一定成立, 举个反例,

取  $z_2=\sqrt{3}+i$ ,  $z_3=1+\sqrt{3}i$ , 则  $|z_2|=|z_3|=2$ , 但  $z_2\neq\pm z_3$ , 故 A 项错误;

B 项, 由  $z_1z_2=z_1z_3$  两端同除以非零复数  $z_1$  可得  $z_2=z_3$ , 故 B 项正确;

C 项, 看到  $|z_1z_2|$ , 想到模的性质  $|z_1z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$ , 因为  $\bar{z}_2=z_3$ , 所以  $|\bar{z}_2|=|z_3|$ ,

又  $|\bar{z}_2|=|z_2|$ , 所以  $|z_2|=|z_3|$ , 故  $|z_1z_2|-|z_1z_3|=|z_1|\cdot|z_2|-|z_1|\cdot|z_3|=|z_1|(|z_2|-|z_3|)=0$ ,

所以  $|z_1z_2|=|z_1z_3|$ , 故 C 项正确;

D 项, 我们知道,  $z_1\cdot\bar{z}_1=|z_1|^2$ , 故要使  $z_1z_2=|z_1|^2$ , 只需  $\bar{z}_1=z_2$  即可, 而不是  $z_1=z_2$ , 下面举个反例,

取  $z_1=1+i$ ,  $z_2=1-i$ , 满足  $z_1z_2=(1+i)(1-i)=1-i^2=2=|z_1|^2$ , 但  $z_1\neq z_2$ , 故 D 项错误.

解法 2: A、B、D 三项的判断方法同解法 1, 对于 C 项, 也可设复数的代数形式来验证,

设  $z_1=a+bi$ ,  $z_2=c+di$ , 其中  $a,b,c,d\in\mathbf{R}$ , 因为  $\bar{z}_2=z_3$ , 所以  $z_3=c-di$ ,

故  $|z_1z_2|=|(a+bi)(c+di)|=|ac+adi+bc+bd^2|=|(ac-bd)+(ad+bc)i|=\sqrt{(ac-bd)^2+(ad+bc)^2}$

$=\sqrt{a^2c^2+b^2d^2-2acbd+a^2d^2+b^2c^2+2adbc}=\sqrt{a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2}$ ,

$|z_1z_3|=|(a+bi)(c-di)|=|ac-adi+bc-bd^2|=|(ac+bd)+(bc-ad)i|=\sqrt{(ac+bd)^2+(bc-ad)^2}$

$=\sqrt{a^2c^2+b^2d^2+2acbd+b^2c^2+a^2d^2-2bcad}=\sqrt{a^2c^2+b^2d^2+b^2c^2+a^2d^2}$ ,

所以  $|z_1z_2|=|z_1z_3|$ , 故 C 项正确.

答案: BC

【反思】实数方程的一些变形方法也适用于复数方程, 例如在复数方程两端加上或减去相同的复数, 方程依然成立; 在复数方程两端同时乘以相同的复数, 或同时除以相同的非零复数, 方程也依然成立.

#### 类型 IV: 复数的几何意义

【例 6】(2023·新高考 II 卷) 在复平面内,  $(1+3i)(3-i)$  对应的点位于 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

解析:  $(1+3i)(3-i)=3-i+9i-3i^2=6+8i$ , 所以该复数对应的点为  $(6,8)$ , 位于第一象限.

答案: A

【变式】在复平面内,  $O$  为坐标原点, 复数  $z_1=i(-4+3i)$ ,  $z_2=7+i$  对应的点分别为  $Z_1$ ,  $Z_2$ , 则  $\angle Z_1OZ_2$  的大小为 ( )

(A)  $\frac{\pi}{3}$  (B)  $\frac{2\pi}{3}$  (C)  $\frac{3\pi}{4}$  (D)  $\frac{5\pi}{6}$

解析:  $\angle Z_1OZ_2$  可看成  $\overline{OZ_1}$  和  $\overline{OZ_2}$  的夹角, 用夹角余弦公式计算,

由题意,  $z_1=i(-4+3i)=-4i+3i^2=-3-4i$ , 所以  $\overline{OZ_1}=(-3,-4)$ , 又  $z_2=7+i$ , 所以  $\overline{OZ_2}=(7,1)$ ,

从而  $\cos \angle Z_1 O Z_2 = \frac{\overline{OZ_1} \cdot \overline{OZ_2}}{|OZ_1| \cdot |OZ_2|} = \frac{-3 \times 7 + (-4) \times 1}{\sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} \times \sqrt{7^2 + 1^2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ , 故  $\angle Z_1 O Z_2 = \frac{3\pi}{4}$ .

答案: C

【例 7】已知  $i$  是虚数单位, 复数  $z$  满足  $|z|=1$ , 则  $|z+1+i|$  的最小值为 ( )


- (A)  $\sqrt{2}-1$  (B)  $\sqrt{2}$  (C)  $2\sqrt{2}-2$  (D) 1

解析: 先设  $z$  的代数形式, 将  $|z|=1$  翻译出来, 设  $z=x+yi$ , 则  $|z|=\sqrt{x^2+y^2}=1$ , 所以  $x^2+y^2=1$  ①,

且  $|z+1+i|=|x+1+(y+1)i|=\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}$  ②, 由方程①可知复数  $z$  在复平面上对应的点  $Z(x,y)$  在单位圆上运动, 式②可看成点  $Z$  与定点  $P(-1,-1)$  的距离, 故画图来看,

如图, 因为  $|OP|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$ , 所以  $|PZ|_{\min}=\sqrt{2}-1$ , 故  $|z+1+i|$  的最小值为  $\sqrt{2}-1$ .

答案: A



【反思】遇到模的最值问题, 可考虑数形结合来分析.

【变式】(2020·新课标 II 卷) 设复数  $z_1, z_2$  满足  $|z_1|=|z_2|=2$ ,  $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$ , 则  $|z_1-z_2|$  = \_\_\_\_\_.

解法 1: 可设  $z_1$  的代数形式,  $z_2$  就不用设了, 由  $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$  求出  $z_2$  即可, 这样变量的个数少一些,

设  $z_1=x+yi(x,y \in \mathbf{R})$ , 则由  $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$  可得  $z_2=\sqrt{3}-x+(1-y)i$ ,

所以  $z_1-z_2=2x-\sqrt{3}+(2y-1)i$ , 故  $|z_1-z_2|=\sqrt{(2x-\sqrt{3})^2+(2y-1)^2}=\sqrt{4(x^2+y^2)-4(\sqrt{3}x+y)+4}$  ①,

条件中还有  $|z_1|=|z_2|=2$  没用到, 把它翻译出来,

因为  $|z_1|=|z_2|=2$ , 所以  $|z_1|^2=|z_2|^2=4$ , 故  $\begin{cases} x^2+y^2=4 & \text{②} \\ (\sqrt{3}-x)^2+(1-y)^2=4 & \text{③} \end{cases}$ ,

由②③可以解出  $x$  和  $y$ , 再来算  $|z_1-z_2|$ , 但计算量较大, 故尝试把式③化简, 看能否整体计算式①,

由③得:  $3-2\sqrt{3}x+x^2+1-2y+y^2=4$ , 结合式②整理得:  $\sqrt{3}x+y=2$  ④,

此时我们发现把②④整体代入①恰好可求得  $|z_1-z_2|$ ,

所以  $|z_1-z_2|=\sqrt{4(x^2+y^2)-4(\sqrt{3}x+y)+4}=\sqrt{4 \times 4 - 4 \times 2 + 4}=2\sqrt{3}$ .

解法 2: 求模也可借助图形来分析, 先把复数  $z_1, z_2$  在复平面内对应的点设出来,

设复数  $z_1, z_2$  在复平面对应的点为  $Z_1, Z_2$ ,


从条件来看,  $\overline{OZ_1}$  和  $\overline{OZ_2}$  的模是已知的, 但夹角不知道, 夹角由条件  $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$  决定,

因为  $z_1 + z_2 = \sqrt{3} + i$ , 所以  $\overline{OZ_1} + \overline{OZ_2} = (\sqrt{3}, 1)$ , 故  $|\overline{OZ_1} + \overline{OZ_2}| = 2$ ,

于是问题变成了在  $|\overline{OZ_1}| = |\overline{OZ_2}| = |\overline{OZ_1} + \overline{OZ_2}| = 2$  的条件下, 求  $|\overline{OZ_1} - \overline{OZ_2}|$ , 这样图形就能画出来了,

如图,  $\triangle OZZ_1$  和  $\triangle OZZ_2$  都是边长为 2 的正三角形, 所以  $|z_1 - z_2| = |\overline{OZ_1} - \overline{OZ_2}| = |\overline{Z_2Z_1}| = 2\sqrt{3}$ .

答案:  $2\sqrt{3}$



**【反思】** 对于模的处理, 有代数和几何两种思路. 本题是近年高考最难的复数题, 画图分析显然更优于代数计算, 在分析模的时候, 可把复数的加减法和向量的加减法对应起来, 即  $|z_1 \pm z_2| = |\overline{OZ_1} \pm \overline{OZ_2}|$ .

#### 类型 V: 复数的高次方运算

**【例 8】** 设  $i$  为虚数单位, 则复数  $\frac{1+i}{i^{2023}} = ( \quad )$

- (A)  $-1+i$     (B)  $-1-i$     (C)  $1+i$     (D)  $1-i$

解析: 先化简分母的  $i^{2023}$ , 因为  $i^{2023} = (i^2)^{1011} \times i = (-1)^{1011} \times i = -i$ , 所以  $\frac{1+i}{i^{2023}} = \frac{1+i}{-i} = \frac{(1+i)i}{-i \cdot i} = i + i^2 = -1+i$ .

答案: A

**【变式】** 已知复数  $z$  满足  $z \cdot \bar{z} = 4$ , 且  $z + \bar{z} + |z| = 0$ , 则  $z^{2022} = ( \quad )$

- (A) 1    (B)  $2^{2022}$     (C) -1    (D)  $-2^{2022}$

解析: 复数  $z$  无法直接求出, 故可先设复数  $z$  的代数形式, 由已知条件建立方程求出  $z$ ,

设  $z = a + bi (a, b \in \mathbf{R})$ , 则  $\bar{z} = a - bi$ , 由题意,  $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = 4$  ①,

又  $z + \bar{z} + |z| = 0$ , 所以  $a + bi + a - bi + \sqrt{a^2 + b^2} = 0$ , 所以  $2a + \sqrt{a^2 + b^2} = 0$  ②,

将①代入②可求得:  $a = -1$ , 代回①可求得  $b = \pm\sqrt{3}$ , 所以  $z = -1 \pm \sqrt{3}i$ ,

接下来讨论两种情况, 分别计算  $z^{2022}$ , 可先从低次方开始算,

当  $z = -1 + \sqrt{3}i$  时,  $z^2 = (-1 + \sqrt{3}i)^2 = 1 + 3i^2 - 2\sqrt{3}i = -2 - 2\sqrt{3}i$ ,

所以  $z^3 = z \cdot z^2 = (-1 + \sqrt{3}i)(-2 - 2\sqrt{3}i) = 2 + 2\sqrt{3}i - 2\sqrt{3}i - 6i^2 = 8$ , 故  $z^{2022} = (z^3)^{674} = 8^{674} = (2^3)^{674} = 2^{2022}$ ;

当  $z = -1 - \sqrt{3}i$  时,  $z^2 = (-1 - \sqrt{3}i)^2 = 1 + 3i^2 + 2\sqrt{3}i = -2 + 2\sqrt{3}i$ ,

所以  $z^3 = z \cdot z^2 = (-1 - \sqrt{3}i)(-2 + 2\sqrt{3}i) = 2 - 2\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}i - 6i^2 = 8$ , 故  $z^{2022} = (z^3)^{674} = 8^{674} = (2^3)^{674} = 2^{2022}$ ;

综上所述,  $z^{2022} = 2^{2022}$ .

答案: B

【反思】涉及复数的高次方计算，往往先计算低次方，寻找规律.

### 强化训练

- (2023·新高考 I 卷·★) 已知  $z = \frac{1-i}{2+2i}$ , 则  $z - \bar{z} =$  ( )  
(A)  $-i$  (B)  $i$  (C)  $0$  (D)  $1$
- (2023·全国乙卷·★)  $|2+i^2+2i^3| =$  ( )  
(A)  $1$  (B)  $2$  (C)  $\sqrt{5}$  (D)  $\sqrt{6}$
- (2022·新高考 I 卷·★) 若  $i(1-z)=1$ , 则  $z + \bar{z} =$  ( )  
(A)  $-2$  (B)  $-1$  (C)  $1$  (D)  $2$
- (2023·全国甲卷·★) 若复数  $(a+i)(1-ai)=2$ , 则实数  $a =$  ( )  
(A)  $-1$  (B)  $0$  (C)  $1$  (D)  $2$
- (★) 若复数  $z = \frac{(3i-1)(1-i)}{i^{2023}}$ , 则  $z$  的虚部为\_\_\_\_\_.
- (★★) 已知复数  $z$  满足  $z-i \in \mathbf{R}$ , 且  $\frac{2-z}{z}$  是纯虚数, 则  $z =$  ( )  
(A)  $-1-i$  (B)  $-1+i$  (C)  $1-i$  (D)  $1+i$

7. (★) 已知  $z = \frac{2i}{1-i} - 1 + 2i$ , 则  $z$  在复平面内对应的点位于 ( )

- (A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

8. (2022 · 山东乳山月考 · ★★★) 已知复数  $z$  满足  $|z-1| = |z-i|$ , 则在复平面内  $z$  对应的点  $Z$  的轨迹为 ( )

- (A) 直线 (B) 线段 (C) 圆 (D) 等腰三角形

9. (2022 · 安徽肥东期末 · ★★★) 设  $\bar{z}$  是复数  $z$  的共轭复数, 若  $\bar{z} \cdot z + 10i = 5z$ , 则  $\frac{z}{2+i} =$  ( )

- (A) 2 (B)  $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$  (C) 2 或  $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$  (D) 2 或  $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$

## 《一数·高考数学核心方法》

10. (2022 · 辽宁月考 · ★★★) (多选) 若  $z_1, z_2$  是复数, 则下列命题正确的是 ( )

- (A) 若  $z_1 - z_2 > 0$ , 则  $z_1 > z_2$   
(B)  $|z_1 \cdot \bar{z}_2| = |z_1| \cdot |z_2|$   
(C) 若  $z_1 z_2 \neq 0$ , 则  $z_1 \neq 0$  且  $z_2 \neq 0$   
(D) 若  $z_1^2 \geq 0$ , 则  $z_1$  是实数

11. (2022 · 福建福州模拟 · ★★★) 设  $i$  为虚数单位,  $z \in \mathbf{C}$ , 且  $(z-i)(\bar{z}+i)=1$ , 则  $|z-3-5i|$  的最大值是 ( )

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8