

第2节 等差、等比数列的基本性质 (★★)

内容提要

诸多等差、等比数列问题，除了直接套用通项公式和前 n 项和公式解题外，若能灵活运用相关性质，往往可以降低计算量，下面总结了一些常用的性质。

1. 等差数列的常用性质：（设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，其前 n 项和为 S_n ）

①下标和性质：若 $m+n=r+s$ ，则 $a_m+a_n=a_r+a_s$ ，其中 $m,n,r,s \in \mathbf{N}^*$ ；特别地，若 $m+n=2r$ ，则 $a_m+a_n=2a_r$ 。

推论： $S_{2n-1} = \frac{(2n-1)(a_1+a_{2n-1})}{2} = (2n-1)a_n (n \in \mathbf{N}^*)$ 。例如， $S_7 = 7a_4$ ， $S_9 = 9a_5$ 等。

②前 n 项和性质： $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列，公差为 $\frac{d}{2}$ （通过 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d$ 易证）。

③片段和性质： $S_m, S_{2m}-S_m, S_{3m}-S_{2m}, \dots$ 也构成等差数列，公差为 m^2d 。

2. 等比数列的常用性质：（设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，其前 n 项和为 S_n ）

①下标和性质：若 $m+n=r+s$ ，则 $a_m \cdot a_n = a_r \cdot a_s$ ，其中 $m,n,r,s \in \mathbf{N}^*$ ；特别地，若 $m+n=2r$ ，则 $a_m \cdot a_n = a_r^2$ 。

②片段和性质：若 $q \neq -1$ 或 m 为奇数，则 $S_m, S_{2m}-S_m, S_{3m}-S_{2m}, \dots$ 也构成等比数列，公比为 q^m 。

注：上述等差数列与等比数列的片段和性质，代入前 n 项和公式即可证明，此处不再赘述。

典型例题

类型 I：等差数列性质的应用

【例 1】已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_3+a_6+a_7=2$ ，则 $a_4+a_5 = (\quad)$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 2

解析：条件中的 a_2 和 a_7 ， a_3 和 a_6 ，以及要求的 a_4+a_5 下标之和都为 9，故可用下标和性质，

由题意， $a_2+a_3+a_6+a_7=(a_2+a_7)+(a_3+a_6)=2(a_4+a_5)=2$ ，所以 $a_4+a_5=1$ 。

答案：B

【例 2】已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_3+a_7=8$ ，则 $S_9 = (\quad)$

(A) 24 (B) 36 (C) 48 (D) 72

解析：由 $a_3+a_7=8$ 可快速求出 a_5 ，利用 $S_{2n-1}=(2n-1)a_n$ 恰好可用 a_5 表示 S_9 ，

由题意， $a_3+a_7=2a_5=8$ ，所以 $a_5=4$ ，故 $S_9=9a_5=36$ 。

答案：B

【变式 1】设等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n, T_n ，若 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{3n+5}{4n-2}$ ，则 $\frac{a_8}{b_8} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：给出 S_n 与 T_n 的比值，可利用 $S_{2n-1}=(2n-1)a_n, T_{2n-1}=(2n-1)b_n$ 转换成 a_n 与 b_n 的比值，

因为 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{3n+5}{4n-2}$, 所以 $\frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{3(2n-1)+5}{4(2n-1)-2} = \frac{3n+1}{4n-3}$,

又 $\frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{(2n-1)a_n}{(2n-1)b_n} = \frac{a_n}{b_n}$, 所以 $\frac{a_n}{b_n} = \frac{3n+1}{4n-3}$, 故 $\frac{a_8}{b_8} = \frac{3 \times 8 + 1}{4 \times 8 - 3} = \frac{25}{29}$.

答案: $\frac{25}{29}$

【变式 2】设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_{4047} > 0$, $S_{4046} < 0$, 则当 $n = \underline{\quad}$ 时, S_n 最小.

解析: 要判断何时 S_n 最小, 只需判断 $\{a_n\}$ 中哪些项为正, 哪些项为负, S_{4047} 可转换成 a_{2024} ,

由题意, $S_{4047} = 4047a_{2024} > 0$, 所以 $a_{2024} > 0$ ①,

又 $S_{4046} = \frac{4046(a_1 + a_{4046})}{2} = 2023(a_1 + a_{4046}) < 0$, 所以 $a_1 + a_{4046} < 0$,

为了把①用起来, 可根据下标和性质将 $a_1 + a_{4046}$ 换成 $a_{2023} + a_{2024}$,

因为 $a_1 + a_{4046} = a_{2023} + a_{2024}$, 所以 $a_{2023} + a_{2024} < 0$, 又 $a_{2024} > 0$, 所以 $a_{2023} < 0$, 故 $d = a_{2024} - a_{2023} > 0$,

所以 $\{a_n\}$ 是递增数列, 故 $a_1 < a_2 < \dots < a_{2023} < 0 < a_{2024} < a_{2025} < \dots$, 所以当 $n = 2023$ 时, S_n 最小.

答案: 2023

【反思】下标和性质 (例 1) 及其推论 (例 2 及其变式) 是等差数列最常用的一条性质, 当出现等差数列中几项相加, 或涉及 S_n 时, 可考虑用下标和性质及其推论.

《一数·高考数学核心方法》

【例 3】在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 其前 n 项和为 S_n , 若 $\frac{S_{10}}{10} - \frac{S_8}{8} = 2$, 则 $S_{40} = \underline{\quad}$.

解法 1: 可将 $\frac{S_{10}}{10} - \frac{S_8}{8} = 2$ 翻译成 a_1 和 d , 求出公差 d , 进而代公式求 S_{40} ,

设 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 因为 $\frac{S_{10}}{10} - \frac{S_8}{8} = 2$, 所以 $\frac{10a_1 + 45d}{10} - \frac{8a_1 + 28d}{8} = 2$, 结合 $a_1 = 1$ 解得: $d = 2$,

故 $S_{40} = 40a_1 + \frac{40 \times 39}{2}d = 40 + 1560 = 1600$.

解法 2: 从 $\frac{S_{10}}{10} - \frac{S_8}{8} = 2$ 的结构特征联想到 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列, 于是可先求出 $\frac{S_n}{n}$,

因为 $\{a_n\}$ 是等差数列, 所以 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 也是等差数列, 设 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的公差为 d' , 则 $\frac{S_{10}}{10} - \frac{S_8}{8} = 2d' = 2$, 所以 $d' = 1$,

又 $\frac{S_1}{1} = a_1 = 1$, 所以 $\frac{S_n}{n} = 1 + (n-1) \times 1 = n$, 从而 $S_n = n^2$, 故 $S_{40} = 40^2 = 1600$.

答案: 1600

【反思】可以看到, 相比之下解法 2 的计算量更小. 在等差数列问题中, 若涉及到 $\frac{S_n}{n}$ 这种结构的条件, 可

考虑用性质 “ $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 也是等差数列” 来求解.

【例 4】已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_{20} = 5$ ， $S_{60} = 45$ ，则 $S_{40} =$ _____.

解析：观察发现 S_{20} ， S_{60} ， S_{40} 的下标都是 20 的整数倍，于是联想到等差数列的片段和性质，因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，所以 S_{20} ， $S_{40} - S_{20}$ ， $S_{60} - S_{40}$ 成等差数列，故 $2(S_{40} - S_{20}) = S_{20} + S_{60} - S_{40}$ ，将 $S_{20} = 5$ 和 $S_{60} = 45$ 代入可得： $2(S_{40} - 5) = 5 + 45 - S_{40}$ ，解得： $S_{40} = 20$.

答案：20

【变式 1】等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_n = 1$ ， $S_{3n} - S_n = 5$ ，则 $S_{4n} =$ ()

- (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 15

解析：观察发现所给条件的下标都是 n 的整数倍，故可联想等差数列的片段和性质，因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，所以 S_n ， $S_{2n} - S_n$ ， $S_{3n} - S_{2n}$ ， $S_{4n} - S_{3n}$ 也是等差数列，设其公差为 d ，由题意， $S_{3n} - S_n = (S_{3n} - S_{2n}) + (S_{2n} - S_n) = (S_n + 2d) + (S_n + d) = 2S_n + 3d = 2 + 3d = 5$ ，所以 $d = 1$ ，到此等差数列 S_n ， $S_{2n} - S_n$ ， $S_{3n} - S_{2n}$ ， $S_{4n} - S_{3n}$ 的首项和公差就都知道了，求和即为 S_{4n} ，


故 $S_{4n} = (S_{4n} - S_{3n}) + (S_{3n} - S_{2n}) + (S_{2n} - S_n) + S_n = 4S_n + \frac{4 \times 3}{2}d = 10$.

答案：A

【反思】等差数列中，若涉及若干与 S_n 有关的条件，且下标都是某正整数的倍数，则可考虑用片段和性质.

【变式 2】(2020·新课标 II 卷) 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所，分上、中、下三层. 上层中心有一块圆形石板 (称为天心石). 环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环，向外每环依次增加 9 块，下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块，向外每环依次也增加 9 块，已知每层环数相同，且下层比中层多 729 块. 则三层共有扇面形石板 (不含天心石) ()

- (A) 3699 块 (B) 3474 块 (C) 3402 块 (D) 3339 块



解析：先把文字信息翻译成数列问题，建立数学模型，

由题意，可设上层从内到外每一环的扇形石板块数分别为 a_1, a_2, \dots, a_m ，中层分别为 $a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_{2m}$ ，下层分别为 $a_{2m+1}, a_{2m+2}, \dots, a_{3m}$ ，则 a_1, a_2, \dots, a_{3m} 构成首项 $a_1 = 9$ ，公差 $d = 9$ 的等差数列，设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，

注意到上、中、下三层扇形石板块数之和分别为 S_m ， $S_{2m} - S_m$ ， $S_{3m} - S_{2m}$ ，故想到片段和性质，

因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，所以 S_m ， $S_{2m} - S_m$ ， $S_{3m} - S_{2m}$ 构成公差为 m^2d 的等差数列，

因为下层比中层多 729 块, 所以 $(S_{3m} - S_{2m}) - (S_{2m} - S_m) = m^2 \times 9 = 729$, 故 $m = 9$, 于是每层有 9 环, 三层共有 27 环, 代等差数列前 n 项和公式即可求得问题答案,

所以三层共有扇面形石板的块数为 $S_{27} = 27 \times 9 + \frac{27 \times 26}{2} \times 9 = 3402$.

答案: C

【总结】 等差数列问题除了用通项、前 n 项和公式处理外, 若能灵活运用有关性质, 可降低计算量.

类型 II: 等比数列性质的应用

【例 5】 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_5 a_6 + a_4 a_7 = 16$, 则 $\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \cdots + \log_2 a_{10} = (\quad)$

(A) 20 (B) 15 (C) 8 (D) $3 + \log_2 5$

解析: 看到 $a_5 a_6$ 和 $a_4 a_7$, 想到等比数列的下标和性质,

由题意, $a_5 a_6 + a_4 a_7 = 2a_5 a_6 = 16$, 所以 $a_5 a_6 = 8$, 故 $\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \cdots + \log_2 a_{10} = \log_2 (a_1 a_2 \cdots a_{10})$
 $= \log_2 [(a_1 a_{10}) \cdot (a_2 a_9) \cdot (a_3 a_8) \cdot (a_4 a_7) \cdot (a_5 a_6)] = \log_2 (a_5 a_6)^5 = 5 \log_2 (a_5 a_6) = 5 \log_2 8 = 15$.

答案: B

【变式】 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 a_5 + 2a_4 a_6 + a_5 a_9 = 8$, 则 $a_3 + a_7 = (\quad)$

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) 4 (D) $2\sqrt{2}$

解析: 要算的是 $a_3 + a_7$, 观察所给等式发现可用下标和性质把它们都化为 a_3 和 a_7 ,

由题意, $a_1 a_5 + 2a_4 a_6 + a_5 a_9 = a_3^2 + 2a_3 a_7 + a_7^2 = (a_3 + a_7)^2 = 8$, 结合 $\{a_n\}$ 各项均为正数得 $a_3 + a_7 = 2\sqrt{2}$.

答案: D

【例 6】 (2021 · 全国甲卷) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_2 = 4$, $S_4 = 6$, 则 $S_6 = (\quad)$

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

解析: 看到 S_2 , S_4 , S_6 , 想到等比数列的片段和性质,

由题意, $\{a_n\}$ 为等比数列, 且公比 $q \neq -1$, 否则 $S_2 = S_4 = 0$, 与题设矛盾,

所以 S_2 , $S_4 - S_2$, $S_6 - S_4$ 成等比数列, 故 $(S_4 - S_2)^2 = S_2(S_6 - S_4)$, 将 $S_2 = 4$ 和 $S_4 = 6$ 代入可求得 $S_6 = 7$.

答案: A

强化训练

类型 I: 等差数列的性质应用

1. (2023 · 河南郑州模拟 · ★) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, a_6 , a_7 是方程 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 的两根, 则 $\{a_n\}$ 的前 12 项和 $S_{12} = (\quad)$

(A) 12 (B) 18 (C) -18 (D) -12

2. (2022·浙江宁波模拟·★) 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均为等差数列, 且 $a_3 + b_5 = 4$, $a_5 + b_9 = 8$, 则 $a_4 + b_7 =$
()

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

3. (2022·重庆模拟·★★) 中国古代数学著作《九章算术》中有如下问题: “今有金箠, 长五尺, 斩本一尺, 重四斤, 斩末一尺, 重二斤. 问次一尺各重几何”? 意思是: “现有一根金锤, 长五尺, 一头粗一头细. 在粗的一端截下一尺, 重四斤; 在细的一端截下一尺, 重二斤. 问依次每一尺各重几斤”? 根据已知条件, 若金锤由粗到细是均匀变化的, 则中间三尺的重量为 ()

- (A) 3斤 (B) 6斤 (C) 9斤 (D) 12斤

4. (2023·河北石家庄模拟·★★) 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_3 = 5$, $a_5 + a_{11} = 20$, 则 $S_{10} =$ _____.

5. (2022·江苏宿迁模拟·★★★★) 若两个等差数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n , B_n , 且 $\frac{A_n}{B_n} = \frac{2n+1}{3n-2}$,

则 $\frac{a_5 + a_{13}}{b_3 + b_{15}}$ 的值为_____.

6. (2022·重庆模拟·★★) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 15$, $S_9 = 75$, 则 $S_6 =$ ()

- (A) 40 (B) 45 (C) 50 (D) 55

7. (★★★) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $\frac{S_3}{S_6} = \frac{1}{4}$, 则 $\frac{S_{15}}{S_9} =$ _____.

8. (2022 · 江苏海安模拟 · ★★★) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{10} = 110$, $S_{110} = 10$, 则 $S_{120} =$ ()
(A) -10 (B) -20 (C) -120 (D) -110

类型 II: 等比数列的性质应用

9. (2023 · 山东济南模拟 · ★) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 a_{10} a_{17} = 8$, 则 $a_{10} =$ ()
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8

《一数·高考数学核心方法》

10. (2022 · 四川绵阳模拟 · ★★★) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $\log_2 a_2 + \log_2 a_{11} = 1$, 且 $a_5 a_6 a_8 a_9 = 16$, 则数列 $\{a_n\}$ 的公比为 ()
(A) 2 (B) 4 (C) ± 2 (D) ± 4

11. (2022 · 江西模拟 · ★★★) 已知 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4 = 6$, $S_8 = 18$, 则 $a_{17} + a_{18} + a_{19} + a_{20} =$ ()
(A) 96 (B) 162 (C) 243 (D) 486

12. (2023 · 福建模拟 · ★★★) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = \frac{1}{3}S_6$, 则 $\frac{S_9}{S_6 - S_3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

《一数·高考数学核心方法》