

第2节 求无参函数的单调区间、极值、最值 (★★)

强化训练

1. (2022·重庆模拟·★★) 函数 $f(x) = x - \frac{6}{x} - 5\ln x$ 的单调递减区间为 ()

- (A) (0,2) (B) (2,3) (C) (1,3) (D) (3,+∞)

答案: B

解析: 由题意, $f'(x) = 1 + \frac{6}{x^2} - \frac{5}{x} = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2} = \frac{(x-2)(x-3)}{x^2}$, $x > 0$,

所以 $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3$, 故 $f(x)$ 的单调递减区间是 (2,3).

2. (2021·全国甲卷节选·★★) 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \frac{x^a}{a^x}$ ($x > 0$), 当 $a = 2$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间.

解: 当 $a = 2$ 时, $f(x) = \frac{x^2}{2^x}$ ($x > 0$), 所以 $f'(x) = \frac{2x \cdot 2^x - 2^x \ln 2 \cdot x^2}{(2^x)^2} = \frac{x(2 - x \ln 2)}{2^x}$,

从而 $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{2}{\ln 2}$, $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > \frac{2}{\ln 2}$,


故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(0, \frac{2}{\ln 2})$, 单调递减区间是 $(\frac{2}{\ln 2}, +\infty)$.

3. (2022·汕头三模·★★) 已知函数 $f(x) = x - 2\sin x$, 求 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上的极值.

解: 由题意, $f'(x) = 1 - 2\cos x$, (可画出 $y = \cos x$ 的图象来看 $f'(x)$ 的正负, 如图)

所以当 $0 < x < \frac{\pi}{3}$ 时, $\cos x > \frac{1}{2}$, 从而 $f'(x) < 0$; 当 $\frac{\pi}{3} < x < \pi$ 时, $\cos x < \frac{1}{2}$, 从而 $f'(x) > 0$;

故 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\pi}{3}, \pi)$ 上单调递增, 所以 $f(x)$ 有极小值 $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$, 无极大值.



4. (2022·郑州期末·★★) 已知函数 $f(x) = xe^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1$, 求函数 $f(x)$ 的极值.

解: 由题意, $f'(x) = (x+1)e^x - x - 1 = (x+1)(e^x - 1)$,

($f'(x)$ 的零点有 -1 和 0 , 它们把实数集划分成了三段, 故分三段分别考虑 $f'(x)$ 的正负)

当 $x < -1$ 时, $x+1 < 0$, $e^x - 1 < 0$, 所以 $f'(x) > 0$;

当 $-1 < x < 0$ 时, $x+1 > 0$, $e^x - 1 < 0$, 所以 $f'(x) < 0$;

当 $x > 0$ 时, $x+1 > 0$, $e^x - 1 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$;

从而 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递增, 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

故 $f(x)$ 有极大值 $f(-1) = -\frac{1}{e} - \frac{1}{2}$, 极小值 $f(0) = -1$.

5. (2022 · 成都期末 · ★★★) 已知函数 $f(x) = 2x \ln x - \frac{1}{2}x^2 - x + 2$, 求 $f(x)$ 在 $(0, 2]$ 上的最小值.

解: 由题意, $f'(x) = 2 \ln x - x + 1$, (此处 $f'(x)$ 不易直接判断正负, 可二次求导)

设 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = \frac{2}{x} - 1 = \frac{2-x}{x}$, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $g'(x) \geq 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, 2]$ 上单调递增,

又 $f'(1) = 0$, 所以当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $1 < x \leq 2$ 时, $f'(x) > 0$,

从而 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, 2]$ 上单调递增, 故 $f(x)$ 在 $(0, 2]$ 上的最小值为 $f(1) = \frac{1}{2}$.

6. (2022 · 天津模拟 · ★★★) 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} + \ln x - x$, 求 $f(x)$ 的单调区间.

解: 由题意, $f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2} + \frac{1}{x} - 1 = \frac{(x-1)(e^x - x)}{x^2}$, $x > 0$, ($x-1$ 和 x^2 的正负情况很明确, 那 $e^x - x$ 这部分呢? 可构造函数分析)

设 $g(x) = e^x - x (x > 0)$, 则 $g'(x) = e^x - 1 > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

又 $g(0) = 1 > 0$, 所以 $g(x) > 0$ 恒成立, 从而 $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$, $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$,

故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(1, +\infty)$, 单调递减区间是 $(0, 1)$.

7. (2023 · 全国甲卷节选 · ★★★) 已知 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^3 x}$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 若 $a = 8$, 讨论 $f(x)$ 的单调性.

解: 若 $a = 8$, 则 $f(x) = 8x - \frac{\sin x}{\cos^3 x}$,

所以 $f'(x) = 8 - \frac{\cos x \cdot \cos^3 x - 3 \cos^2 x (-\sin x) \sin x}{\cos^6 x} = 8 - \frac{\cos^2 x + 3 \sin^2 x}{\cos^4 x} = \frac{8 \cos^4 x - \cos^2 x - 3 \sin^2 x}{\cos^4 x}$,

(要判断正负, 可将 $\sin^2 x$ 换成 $1 - \cos^2 x$, 统一函数名)

故 $f'(x) = \frac{8 \cos^4 x - \cos^2 x - 3(1 - \cos^2 x)}{\cos^4 x} = \frac{8 \cos^4 x + 2 \cos^2 x - 3}{\cos^4 x} = \frac{(2 \cos^2 x - 1)(4 \cos^2 x + 3)}{\cos^4 x}$,

(此式的正负与 $2 \cos^2 x - 1$ 相同, 故只需考虑它在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的正负, 其零点为 $\frac{\pi}{4}$, 故以 $\frac{\pi}{4}$ 为分界点讨论)

当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $\frac{\sqrt{2}}{2} < \cos x < 1$, 所以 $2 \cos^2 x - 1 > 0$, 故 $f'(x) > 0$,

当 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $0 < \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $2 \cos^2 x - 1 < 0$, 故 $f'(x) < 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增, 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减.